

DaciHer

Описание

DaciHer (Дасихэп) – это ингибитор вирусного (вируса гепатита С) белка NS5A, который используется при репликации вируса гепатита С внутри клеток печени (гепатоцитов) и, таким образом, препятствует поступлению вируса из зараженных гепатоцитов в кровь. Благодаря такому действию, удается предотвратить распространение вируса в организме.

СОСТАВ:

1 таблетка **DaciHer** содержит действующее вещество:
даклатасвир – 60 мг.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

DaciHer (даклатасвир) является ингибитором неструктурного белка 5A(NS5A), многофункционального протеина, необходимого для репликации ВГС, и таким образом подавляет два этапа жизненного цикла вируса – репликацию вирусной РНК и сборку вирионов.

На основании данных, полученных *in vitro*, и данных компьютерного моделирования показано, что даклатасвир взаимодействует с N-концом в пределах домена 1 белка, который может вызывать структурные искажения, препятствующие реализации функций белка NS5A.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Даклатасвир показан в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения хронического гепатита С у взрослых. Препарат является мощным пангенотипическим ингибитором комплекса репликации вируса гепатита С генотипов генотипов 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Рекомендуемая дозировка **Dacihep** — одна таблетка 60 мг перорально один раз в день с пищей или без нее. Таблетку нельзя разжевывать или измельчать, лучше ее проглотить и запить стаканом воды. Лекарство дает лучший эффект, если его принимать ежедневно в одно время.

Dacihep применяют в комбинации с другими лекарственными препаратами для лечения хронического гепатита С. Монотерапия **Dacihep** не рекомендуется.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Повышенная чувствительность к даклатасвир.
- Аллергическая реакция на какой-либо компонент препарата;
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (КК<30 мл/мин) или терминальная стадия почечной недостаточности, когда необходимо проведение гемодиализа.

При почечной и печеночной недостаточности требуется контроль врача. Комбинированный режим **Dacihep** и рибавирина противопоказан пациентам, для которых рибавирин противопоказан.

Нельзя совмещать лечение препаратом и кормление грудью. Нет точных данных, проникает ли компонент (**Dacihep**) в грудное молоко.

ОСОБЕННОСТИ:

Даклатасвир противопоказан в сочетании с сильными индукторами CYP3A4 и P-gp, например:

- фенитоин
- карбамазепин
- окскарбазепин

- фенобарбитал
- рифампицин
- рифабутин
- рифапентин
- системный дексаметазон и растительные препараты зверобоя (*Hypericum perforatum*), которые могут привести к снижению экспозиции и потери эффективности даклатасвира.

Совместный прием с этими лекарствами может привести к нарушению их действия на организм.

Понадобится консультация врача, если у вас есть язва желудка, изжога или рефлюксная болезнь и вы принимаете лекарства от них. Эти лекарства способны привести к снижению концентрации **Daciher** в крови пациента.

Врач может изменить методику лечения, выписав вам другие препараты для лечения симптомов изжоги, язвенной болезни или рефлюксной болезни или посоветовать, как именно и в какое время лучше принимать каждый из препаратов.

При приеме препарата могут возникнуть побочные эффекты, но их проявление не обязательно и интенсивность может быть разной. В случае возникновения побочных эффектов обратитесь к своему лечащему врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре от 15 до 30 °C.