

SoviHep V

Описание

SoviHep V (Совихеп В) — комбинированный препарат, состоящий из софосбувира 400 мг, нуклеотидного аналога, ингибирующего полимеразу NS5B ВГС, и велпатасвира 100 мг — нового ингибитора NS5A.

СОСТАВ:

SoviHep V состоит из двух действующих веществ в одной таблетке: велпатасвир 100 мг и софосбувир 400 мг.

Благодаря мощному составу, **SoviHep V** широко используется для борьбы с вирусом гепатита С генотипов 1-6. Его можно назначать в виде монотерапии или для комбинированного лечения у пациентов с циррозом или без цирроза печени. Высокая эффективность препарата против всех генотипов HCV обусловлена наличием в его составе действующих веществ: sofosbuvir + velpatrasvir.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

SoviHep V представляет собой фиксированную дозу комбинации sofosbuvir и velpatasvir, которые являются противовирусными агентами прямого действия против вируса гепатита С. Софосбувир является ингибитором РНК-зависимой РНК-полимеразы HCV NS5B, которая необходима для репликации вируса. Velpatasvir является ингибитором белка NS5A HCV, который необходим для репликации вируса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

SoviHep V предназначен для лечения пациентов с хроническим вирусом гепатита С генотипов 1, 2, 3, 4, 5 или 6 без цирроза или с компенсированным циррозом, а также для пациентов с декомпенсированным циррозом для использования в сочетании с рибавирином.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Рекомендуемая дозировка **SoviHep V** — одна таблетка перорально один раз в день с пищей или без нее. Таблетку нельзя разжевывать или измельчать, лучше ее проглотить и запить стаканом воды. Лекарство дает лучший эффект, если его принимать ежедневно в одно время.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Повышенная чувствительность к велпатасвиру или софосбувиру;
- Аллергическая реакция на какой-либо компонент препарата;
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (КК<30 мл/мин) или терминальная стадия почечной недостаточности, когда необходимо проведение гемодиализа.

При почечной и печеночной недостаточности требуется контроль врача. Комбинированный режим **SoviHep V** и рибавирин противопоказан пациентам, для которых рибавирин противопоказан.

Нельзя совмещать лечение препаратом и кормление грудью. Нет точных данных, проникает ли каждый из компонентов (Sofosbuvir или Velpatasvir) в грудное молоко.

ОСОБЕННОСТИ:

Сообщите вашему врачу, если принимаете любое из ниже перечисленных лекарств:

- Amiodaron – препарат для коррекции нарушений сердечного ритма
- Rifapentin – антибиотик, назначаемый при ряде инфекций, в т.ч. туберкулезе
- Oxcarbazepin – противосудорожный препарат, назначаемый при эпилепсии

- Tenofoviridisoproxilfumarat (или препараты с Tenofoviridisoproxilfumarat) – при лечении ВИЧ инфекции
- Efavirenz – назначается при ВИЧ
- Dabigatran – препарат для снижения свертываемости крови
- Modafinil – средство для устранения сонливости
- Гликозиды – сердечные препараты
- Статины, в т.ч. Rosuvastatin – назначаются при высоком содержании холестерина

Совместный прием с этими лекарствами может привести к нарушению их действия на организм.

Понадобится консультация врача, если у вас есть язва желудка, изжога или рефлюксная болезнь и вы принимаете лекарства от них. Эти лекарства способны привести к снижению концентрации **SoviHep V** в крови пациента.

Врач может изменить методику лечения, выписав вам другие препараты для лечения симптомов изжоги, язвенной болезни или рефлюксной болезни или посоветовать, как именно и в какое время лучше принимать каждый из препаратов.

При приеме препарата могут возникнуть побочные эффекты, но их проявление не обязательно и интенсивность может быть разной. В случае возникновения побочных эффектов обратитесь к своему лечащему врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре от 15 до 30 °С.