

## Sovihep

### Описание

**Sovihep (Совихеп)** — противовирусный препарат из группы аналогов нуклеотидов, ингибитор РНК-зависимой РНК-полимеразы NS5B, используемый в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения гепатита С.

### СОСТАВ:

1 лекарственная форма содержит действующее вещество — 400 мг софосбувира.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Софосбувир ингибирует вирусный белок NS5B — РНК-полимеразу, которая используется при репликации вируса гепатита С для копирования его собственной РНК.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Лечение хронического гепатита С у взрослых пациентов (в комбинации с другими лекарственными препаратами).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Рекомендуемая дозировка **Sovihep** — одна таблетка 400 мг перорально один раз в день с пищей или без нее. Таблетку нельзя разжевывать или измельчать, лучше ее проглотить и запить стаканом воды. Лекарство дает лучший эффект, если его принимать ежедневно в одно время.

**Sovihep** применяют в комбинации с другими лекарственными препаратами для лечения хронического гепатита С. Монотерапия **Sovihep** не рекомендуется.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Повышенная чувствительность к даклатасвир.
- Аллергическая реакция на какой-либо компонент препарата;
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (КК<30 мл/мин) или терминальная стадия почечной недостаточности, когда необходимо проведение гемодиализа;
- Декомпенсированный цирроз печени.

При почечной и печеночной недостаточности требуется контроль врача.

Комбинированный режим **Sovihep** и рибавирина противопоказан пациентам, для которых рибавирин противопоказан.

Нельзя совмещать лечение препаратом и кормление грудью. Нет точных данных, проникает ли компонент (**Sovihep**) в грудное молоко.

## ОСОБЕННОСТИ:

Софосбувир противопоказан в сочетании с сильными индукторами Р-гликопротеина, например:

- рифампицин  
зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum*)
- карбамазепин
- фенитоин
- фенобарбитал
- окскарбазепин

Совместный прием с этими лекарствами может привести к нарушению их действия на организм.

Понадобится консультация врача, если у вас есть язва желудка, изжога или рефлюксная болезнь и вы принимаете лекарства от них. Эти лекарства способны привести к снижению концентрации **Sovihep** в крови пациента.

Врач может изменить методику лечения, выписав вам другие препараты для лечения симптомов изжоги, язвенной болезни или рефлюксной болезни или посоветовать, как именно и в какое время лучше принимать каждый из препаратов.

При приеме препарата могут возникнуть побочные эффекты, но их проявление не обязательно и интенсивность может быть разной. В случае возникновения побочных эффектов обратитесь к своему лечащему врачу.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

При температуре от 15 до 30 °С.